

BS SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 12

Týden: 30

Období: 27. 7. – 2. 8. 2022

PADLÍ RÉVOVÉ



Při velmi vysokých až supertropických teplotách nad 35 °C padlí postupně slábne. I tímto lze setrvalý pokles infekčního tlaku napříč hodnocenými lokalitami vysvětlit. Pro nadcházející fáze vybarvování a zrání je toto pro vinaře jistě pozitivní zpráva. Na postižených místech aplikujte do fáze vybarvování bobulí nadále systémově účinkující fungicidy. Na silně napadených místech lze navíc provést poslední aplikaci síry (KUMULUS, SULFOMAX), příp. KARATHANE NEW (kurativní, eradikativní a preventivní účinek; omezuje navíc výskyt svilušek). Tlak padlí révového je nyní obecně na střední až slabé úrovni a měl by nadále slábnout. Proti padlí révy lze keře dále bránit kombinací pěstitelských postupů a ekologických přípravků, které zlepšují vitalitu a odolnost rostliny.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ



Minulé období nijak výrazně neovlivnilo vzestup/pokles podmínek vhodných pro šíření infekce. Na většině míst tak zůstává situace stejná, tlak hodnotíme obecně středně až slabě silný. Doba do vybarvování hroznů je stále vhodná k použití kombinovaných přípravků, které působí současně proti plísni révy a plísni šedé. Tyto na silně napadených místech navíc kombinujte s rychle působícími kontaktními fungicidy. Účinné látky je vhodné při každé aplikaci obměňovat. Je nutné chránit především nové přírůstky, které jsou k napadení nejcitlivější. Proti plísni šedé vyzkoušejte novinku SERIFEL (obsahuje novou účinnou látku), která je vhodná z pohledu antirezistentní strategie. Vzhledem k očekávanému počasí (předpoklad deštových přeháněk a mírné ochlazení) je tedy nyní potřebné věnovat zvýšenou pozornost ošetření proti botrytidě. Postupně s narůstající koncentrací cukrů v bobulích přijde následně i období zvýšené vnímavosti hroznů k infekci.



Infekční tlak:

silný
střední
slabý

Další důležité informace:

U náchylných odrůd révy (André, Frankovka, Müller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Tramín, Zweigeltrebe aj.) se v těchto dnech mohou projevovat první známky odumírání třapiny hroznů (fyziologické porucha). Tato porucha je dána především nedostatkem přijatelného hořčíku, který je u zmíněných odrůd vhodné v průběhu vegetace doplňovat listovou výživou. Ošetření se provádí na počátku nebo těsně před zaměkáním a je nutné jej zopakovat. Doporučujeme listová hnojiva jako HOŘKÁ SŮL nebo VÍNOFIT. Posílit pevnost buněčných stěn a tím i částečně zabránit zavadání lze s hnojivy LAMAG VÁPŇÍK, WUXAL KALCIUM, příp. HARMONIE VÁPŇÍK. Vápník navíc představuje jednu z nepřímých ochranných proti šedé hnilobě.

Sluneční úžeh značí aktuální problém viditelný na více vinicích. V bobulích, exponovaných ke slunečnímu záření, mohla během tropických dnů teplota vystoupat až o 10°C, tj. některé bobule tak měly uvnitř až 45 °C! Takový extrém už může být destruktivní nejenom pro slupku, dužninu bobule, ale také pro celkový enzymatický systém. Krátce před zaměkáním bobulí proto není vhodné odlistění zóny hroznů, protože bobule se nachází v nejcitlivějším stádiu ve vztahu ke slunečnímu úžehu. Omezené odlišťování okolí hroznů je samozřejmě vhodné s ohledem na proudění vzduchu. Velmi zjednodušeně řečeno, v žádném případě by neměly být hrozny během extrémních teplot vystaveny celodennímu slunečnímu svitu. Postižené bobule by ve většině případů měly zaschnout, bude-li nyní převažovat slunečné počasí. Napadení bobulí je typické propadáním slupky, ta se zbarvuje do hnědé až fialové barvy. Při silnějším napadení dochází k scvrkávání a zasychání bobulí. Takto extrémně poškozené bobule již nejsou vhodné ke zpracování na víno. Jelikož jsou často poškozené pouze části exponovaných hroznů, bylo by velice obtížné a časově náročné hrozny třídit ve vinici. Je proto třeba hrozny co nejšetrněji vylisovat a minimalizovat jakýkoliv delší kontakt poškozených hroznů s moštem. Mohlo by docházet k extrakci hořkých látek do moštu a vína. K částečnému posílení odolnosti, resp. pevnosti slupek bobulí je možné doporučit před každou očekávanou vlnou veder aplikaci listové výživy s vysokým obsahem vápníku a také při zřetelném poškození bobulí úžehem použít preventivní přípravky proti plísni šedé.



Doporučené přípravky dle intenzity infekčního tlaku pro profi/hobby uživatele

PADLÍ RÉVOVÉ

PROFI

HOBBY

SPIROX D+KUMULUS	DYNALI+KUMULUS
VIVANDO	TOPAS
KUMULUS	KUMULUS

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

PROFI

HOBBY

MELODY COMBI+AIRONE	FOLPAN+CHAMPION
PEGASO F	FOLPAN
AIRONE	CHAMPION


Infekční tlak:

silný

střední

slabý

Intenzita infekčního tlaku dle jednotlivých lokalit:



Výhled počasí

Oproti minulým tropickým dnům můžeme očekávat polojasno a mírné ochlazení na již příjemnější letní teploty. Během víkendu se mohou objevovat na některých lokalitách srážky. Podmínky pro vybarvování bobulí až začátek zrání velmi raných odrůd jsou příznivé.

