

BS SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 6

Týden: 24

Období: **15. 6. – 21. 6. 2022**



PADLÍ RÉVOVÉ ●

Letošní ročník se jeví zajímavým výraznými rozdíly v úrovních tlaků chorob mezi vzájemně sousedícími lokalitami. Na některých místech panují velmi vhodné podmínky pro padlí i plíseň, o kousek dále však zůstávají podmínky pro rozvoj obou chorob nepříznivé. Taková situace se odvíjí především od množství doposud spadlých srážek na dané lokalitě. Na většině míst panuje momentálně střední úroveň infekčního tlaku padlí. Na místech, kde se vyskytly intenzivní srážky, lze očekávat mírný pokles podmínek vhodných pro šíření patogenu. Případné teploty nad 33 °C a intenzivní slunečné počasí, které očekáváme v následujících dnech, by mohlo vývoj padlí zpomalit výrazněji. Před kvetením a po kvetení je ale určitě nutné provést systémové ošetření rostlin.



PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Na některých vinicích se již mohou vyskytovat první viditelné příznaky plísně révové. Díky vydatným srážkám v minulém období a příznivým teplotám nadále panují středně vhodné podmínky pro chorobu. I tohoto důvodu je před a po kvetení důležité provést ochranu systémovými přípravky. Ideální jsou ty, které fungují zároveň i proti plísni šedé. Případná kombinace s postřikem na bázi síranu měďnatého (např. CUPROXAT) je v tuto chvíli žádoucí. Na místech, kde došlo k opakovanému splnění podmínek vhodných pro šíření patogenu, je vhodné použití přípravků na bázi fosfonátů vykazujících dlouhodobý účinek (např. CASSIOPEE, nebo PROFILER). Dlouhodobě účinkující přípravky mají své opodstatnění především před kvetením nebo v případě, že očekáváme dlouhodobější srážky.



Další důležité informace:


V období před a po kvetení je vhodné podpořit rostliny listovou aplikací mikroživin. Zejména u odrůd citlivých na sprchávání je toto opatření na místě. Důležité pro zdravý odkvět jsou mimo jiné přípravky s vyšším obsahem bóru, molybdenu a zinku. Na našich prodejnách nyní, kromě pravidelně doporučovaných listových hnojiv, najdete novinky **MICROSTIM RÉVA I** (s formulací živin před kvetením) a **II** (s formulací mikroživin po odkvětu). Problematická bývá během kvetení také chloróza, ta trápí i letos nejednoho vinaře. I zde tedy doporučujeme použít například novinku s chelátově vázaným železem **MICROSTIM Fe**, příp. vodorozpuštěné hnojivo **YARA VITA Tenso Fe** nebo **CARBON Fe-Si**.

Před kvetením révy vinné dodržujte poloviční dávky přípravků na ochranu rostlin na doporučené množství vody. **Během fáze kvetení rostliny neošetřujte.** Zejména při vysokých teplotách a intenzivním slunečním svitu, což očekáváme v následujícím období, by tak mohlo dojít k výraznému poškození květenství postřikem.



Výhled počasí

Po srážkově bohatém období očekáváme výrazné oteplení. Teploty budou atakovat 30 °C. Některé modely dokonce pro nadcházející období naznačují, že jsou pravděpodobné teploty až o 6°C nad dlouhodobým průměrem.





obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice		
Bzenec		
Čejkovice		
Kobylí		
Lednice		
Mikulčice		
Mikulov		
Hustopeče		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Sedlec		
Strážnice		
Svatobořice		
Valtice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Nové Zámky (SK)		
Šenkvice (SK)		
Nitra (SK)		
Golianovo - Darmoty (SK)		
slabý	střední	silný

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

PRONTO

DYNALI

MELODY COMBI

FOLPAN

LUNA EXPERIENCE

MAGNICUR CORE

MILDICUT

CHAMPION

KUMULUS

KUMULUS

CUPROXAT

BYLINKOVÁ SMĚS NA PLÍSNĚ

Legenda

slabý

střední

silný