

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 13

Týden: 32

Období: 9. 8. - 16. 8. 2023



PADLÍ RÉVOVÉ ●

Infekční tlak padlí směrem k době dozrávání začíná postupně stagnovat a vnímavost keřů k infekci se tak bude nadále snižovat. V případě velmi silných příznaků u napadených rostlin a dále pak u pozdních odrůd lze v případě potřeby použít přípravky s delší ochrannou lhůtou až 35 dní, například SPIROX D nebo TOPAS. Naopak u již dozrávajících odrůd je vhodná např. LUNA EXPERIENCE, která má pouze 14 dnů OL, příp. BELANTY s OL 21 dnů. Využít lze i některé z pomocných přípravků na ochranu rostlin nebo výživy (DRAFOS), které posílí přirozenou rezistenci rostlin. Tlak padlí révového je nyní obecně na střední úrovni, výhledově by měl již měl jen slábnout. Citlivé k napadení mohou být zejména mladé zálistky, které jsou důležité pro tvorbu cukrů v hroznech. **Hlavní doporučené přípravky na následující období: KUMULUS, SULFOMAX, PRONTO, SPIROX, DYNALI, ALCEDO, DOMARK, VIVANDO, BELANTY, TOPAS, LUNA EXPERIENCE, SONATA.**



PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●●

Prakticky na všech hodnocených lokalitách došlo díky vydatným srážkám ke zvýšení vhodnosti podmínek pro plíseň révy a šedou hnilobu révy. Například v Bzenci spadlo během 3 dnů až 94 mm srážek, v Dubňanech to bylo 80 mm. Takové množství vody indikuje dlouhodobě ovlhčenou půdu a s tím i vyšší riziko rozvoje šedé hniloby hroznů. Při ochraně révy vinné je třeba si uvědomit důležitost zálistků. Révové keře potřebují zálistky až do konce vegetace jakožto prostředek pro kvalitní zrání hroznů. Je proto třeba, aby především tato listová plocha zůstala do sklizně zdravá. **Hlavní doporučené přípravky na následující období: MILDICUT, MOMENTUM, PROFILER, MELODY COMBI, PEGASO F, CASSIOPEE, DEFENDER DRY, ALTELA, FLOWBRIX, dále TELDOR, SWITCH, SCALA, SERENADE ASO, MAGNICUR QUICK.**



Další důležité informace:


Před použitím veškerých přípravků na ochranu rostlin zohledněte jejich ochrannou lhůtu, kterou je nutné respektovat ve vztahu k plánovanému termínu sklizně. Zamezíte tak výskytu nežádoucích reziduí v bobulích. Toto je nutné dodržovat i u POR určených pro ekologické zemědělství. U měďnatých fungicidů bývá OL většinou delší, u přípravků AIRONE, CUPROXAT nebo DEFENDER trvá jen 21 dnů.



Zvýšenou pozornost je vhodné v této době věnovat i prevenci proti bílé hnilobě, která se může rozvinout u zrajících až zralých bobulí. Napadené bobule postupně měknou, hnijí a obvykle rychle sesychají. Proti bílé hnilobě hroznů je vhodný fungicid MELODY COMBI nebo pomocný prostředek AQUA VITRIN K. Vedlejší účinnost vykazuje např. FOLPAN. Choroba se vyskytuje spíše lokálně a především pak na místech, kde došlo k masovému poranění bobulí (krupobití, obaleči...). Mezi náchylné odrůdy řadíme AURELIUS a DĚVÍN.



Výhled počasí



Chladné počasí na jaře, v květnu a naopak horké v červenci (více dní přes 35 °C) zpomalilo dozrávání hroznů révy vinné asi o 10 dnů oproti loňským termínům. Termíny sklizně tak budou oproti loňsku minimálně o týden zpožděny. Následující období bude z pohledu počasí příznivé pro zrání.

INTENZITA
INFEKČNÍHO
TLAKU DLE
VYBRANÝCH
LOKALIT

obec	INFEKČNÍ TLAK	
	PADLÍ RÉVOVÉ	PLÍSEŇ RÉVOVÁ
BLATNICE	Red	Red
BZENEC	Yellow	Red
DUBŇANY	Yellow	Red
KOBYLÍ	Yellow	Yellow
MIKULČICE	Red	Yellow
MIKULOV	Red	Yellow
NOSISLAV	Red	Green
PAVLOV	Yellow	Red
POPICE	Yellow	Green
SEDLEC	Yellow	Red
STRÁŽNICE	Yellow	Yellow
SVATOBŔŘICE	Yellow	Red
VALTICE	Green	Yellow
VELKÉ BÍLOVICE	Red	Yellow
VELKÉ PAVLOVICE	Red	Green
ZNOJMO	Yellow	Yellow
MODRA (SK)	Red	Green
ŠENKVICE (SK)	Yellow	Yellow
NITRA (SK)	Yellow	Yellow
ČACHTICE (SK)	Red	Yellow

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

SERCADIS+SILWET

TOPAS+SILWET

PROFILER+SILWET

FOLPAN+SILWET

BELANTY

BELANTY

MOMENTUM

FOLPAN+ALTELA

SULFOMAX

SULFOMAX

FLOWBRIX

CHAMPION

slabý

střední

silný