



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 10

Týden: 29

Období: 19. 7. - 26. 7. 2023

PADLÍ RÉVOVÉ ●●

Na některých vinicích jsou v letošním roce chorobou výrazněji napadeny kromě květenství i postupně se vyvíjející hrozny. Na takových místech je zapotřebí použít velmi účinné kurativní přípravky jako například KARATHANE NEW. Doporučuje se napadené bobule doslova omýt postřikovou kapalinou. V současné době panuje na všech lokalitách obecně střední infekční tlak padlí. Intenzivní dlouhodobou ochranu je tak aktuálně potřebné aplikovat prakticky všude. V následujícím dnech by především v jihovýchodní části Moravy měly dle předpovědi převládat nepříznivé podmínky pro patogen. To díky velmi vysokým teplotám na vinicích nad 33 °C, kdy dochází k útlumu šíření choroby. Hlavní doporučené přípravky na následující období: **KUMULUS, SULFOMAX, PRONTO, DYNALI, ALCEDO, DOMARK, VIVANDO, BELANTY, TOPAS, LUNA EXPERIENCE, SONATA.**



PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●●

Nežádka letos zaznamenáváme dobře viditelná napadení plísní přímo na hroznech. Mimo jiné to svědčí o silné aktivitě patogenu. Dokonce i v případě některých rezistentních PIWI odrůd lze zaznamenat specifické obranné reakce ve formě hnědých nekrotických míst. Hrozny mohou bohužel v horších případech hnědnout až úplně zasychat. Toto jsou jasné ukazatele toho, že je potřeba zintenzivnit ochranu keřů, protože do sběru je ještě daleko. Doporučujeme do postřiků zapojit přípravky se spolehlivým kurativním účinkem. Jak již bylo zmíněno, spolehlivými pomocníky jsou v tomto směru CYMBAL nebo MELODY COMBI. Hlavní doporučené přípravky na následující období: **MILDICUT, PROFILER, MELODY COMBI, PEGASO F, CASSIOPEE, DEFENDER DRY, ALTELA, FLOWBRIX.**



Další důležité informace:


Doporučujeme v případě každé jednotlivé choroby **střídat přípravky s odlišným mechanismem působení** (obsahující odlišné účinné látky) a **vždy dodržovat doporučené dávkování**. Nezapomínejte také k posílení odolnosti rostlin přidávat do každého postřiku **síru a vhodnou listovou výživu**.

Dle aktuálního vývoje a také vždy u rizikových porostů by měly co nejrychleji proběhnout patřičné **zelené práce**. Konkrétně je důležité především citlivé odlistění v okolí zóny hroznů s cílem zajištění lepšího proudění vzduchu, snížení rizika infekce a zvýšení účinnosti fungicidů při samotném ošetřování keřů. Odlišťování provádějte „s citem“. Bohužel se nyní často setkáváme s následky extrémně silného odlistění, kdy poté došlo až k úžehu bobulí. **Během současných vysokých teplot doprovázených silným slunečním svitem je vhodné s odlistěním počkat na příznivější podmínky, resp. na teploty pod 30 °C a slabší sílu slunečních paprsků.**

Nezabírají vám léty osvědčené přípravky proti padlí? Vyzkoušejte přípravek **BELANTY**, který díky nové účinné látce **mefentriplukonazol** vykazuje významnou reziduální aktivitu. Pokud na zahrádce pečujete i o jiné rostliny (jádroviny, peckoviny, brambory), můžete jej využít i v boji **proti moniliové spále, hnilobě peckovin nebo černé hnilobě**. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost ale i okamžitý kurativní účinek. Použijte v koncentraci 0,2 %, resp. 2 kg/ha. Nabízíme v balení 18 ml, 100 ml a 1 l.



Výhled počasí



INTENZITA
INFEKČNÍHO
TLAKU DLE
VYBRANÝCH
LOKALIT

obec	INFEKČNÍ TLAK	
	PADLÍ RÉVOVÉ	PLÍSEŇ RÉVOVÁ
BLATNICE	střední	střední
BZENEC	střední	střední
DUBŇANY	střední	silný
KOBYLÍ	střední	střední
MIKULČICE	střední	střední
MIKULOV	střední	střední
NOSISLAV	střední	střední
PAVLOV	střední	střední
POPICE	střední	střední
SEDLEC	střední	střední
STRÁŽNICE	střední	střední
SVATOBOŘICE	střední	střední
VALTICE	střední	střední
VELKÉ BÍLOVICE	silný	střední
VELKÉ PAVLOVICE	střední	střední
ZNOJMO	střední	střední
MODRA (SK)	střední	střední
ŠENKVICE (SK)	střední	střední
NITRA (SK)	střední	silný
ČACHTICE (SK)	střední	silný

slabý střední silný

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

VIVANDO+SILWET

BELANTY+SILWET

CYMBAL+SILWET

FOLPAN+SILWET

DYNALI

DYNALI

PROFILER

ALTELA

KUMULUS

KUMULUS

FLOWBRIX

CHAMPION

Infekční tlak

slabý

střední

silný