

BS SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 1

Týden: 20

Období: 16. 5. - 22. 5. 2023



PADLÍ RÉVOVÉ ●

Na základě dosavadního průběhu, současných srážek a nižších teplot se téměř na všech jihomoravských vinicích nevyvinuly vhodné podmínky pro primární infekce. V tuto chvíli je plně dostačující prevence ve formě sirnatých přípravků v dávkách vyplývajících z příbalových letáků. Na místech, kde je evidentní silný růstový progres je možné uvažovat o použití jiného kontaktního přípravku. Na základě signalizace padlí na révě podle kasta je už v tuto chvíli možné zhodnotit situaci jako zhoršenou ve Velkých Bílovicích. Hlavní doporučené přípravky na následující období: KUMULUS, SULFOMAX, BIOAN.



PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

V polovině května zatím nebyly splněny podmínky vhodné pro primární infekce. Vzhledem k nezadržitelnému tempu růstu keřů je, stejně jako v případě padlí, doporučeno po deštích provést kontaktními přípravky jeden z prvních ochranných postřiků. V případě, že spadne v následujícím období větší množství srážek a poté citelně vzrostou teploty, může nastat problém. V takovém období už nebude možné s první ochranou otálet. Jako první vhodné přípravky proti peronospoře doporučujeme přednostně použít kontaktní. Hlavní doporučené přípravky na následující období: CHAMPION, MILDICUT, FOLPAN, CUPROXAT.



Další důležité informace:




HÁLČIVEC RÉVOVÝ, VLNOVNÍK RÉVOVÝ

Na některých místech lze zaznamenat příznaky napadení hálčivci. Již před rašením měla při proběhnutí pravidelná preventivní ochrana sírou v odpovídající dávce. Aktuálně lze využít přípra **PŘEZIMUJÍCÍ ŠKŮDCI** nebo **ORTUS**.



Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné


Začátek roku a prakticky celé zimní období bylo ve znamení nedostatku srážek. Situace se změnila až nedávno, kdy často a mnohdy i celkem intenzivně zapršelo. Proto je situace se zásobením půd vodou aktuálně velmi slušná a to vypadá z pohledu sezóny nadějně. Příznivé teploty a dostatek vláhy jsou velmi dobrým předpokladem slušně rozjíždějí sezóny. Dlouhodobý výhled predikuje až do 19. června průměrné či jen lehce nadprůměrné teploty vzduchu, což je z pohledu začátku vegetativního růstu révy vinné žádoucí.



Nejen v případě chorob myslíme na prevenci, ta je nutná i u řady nezvaných škůdců. Na vinicích s pravidelným výskytem obalečů doporučujeme aktuální preventivní ochranu s přípravkem **SPINTOR**. Pozornost si již v této době zaslouží také ochrana proti sviluškám – doporučujeme proto **NISSORUN** nebo eko **BYLINKOVOU SMĚS NA SVILUŠKY**.



Výhled počasí



Od fáze 5i listů obecně vždy doporučujeme věnovat se preventivním postřikům proti chorobám a škůdcům. První preventivní postřiky se doporučují provádět 1-2x před kvetením. Vhodné je také zapojení listových hnojiv na bázi dusíku, ideálně v kombinaci se sírou. V případě síry je ale nutné počítat se solidním účinkem pouze v případě aplikace během teploty vyšší než 16(17) °C, optimální účinnost postřiku je pak do 25 °C.

INTENZITA
INFEKČNÍHO
TLAKU DLE
VYBRANÝCH
LOKALIT

obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice		
Bzenec		
Dubňany		
Kobylí		
Lednice		
Mikulčice		
Mikulov		
Nosislav		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Sedlec		
Strážnice		
Svatobořice		
Valtice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Svatý Jur (SK)		
Šenkvice (SK)		
Nitra (SK)		

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové


plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY



KUMULUS

KUMULUS

MILDICUT

CHAMPION