MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 10	Týden: 28	Období: **13. 7. - 19. 7. 2021**

PADLÍ RÉVOVÉ

Padlí révy se nyní může už znatelně objevovat na listech i vyvíjejících se hroznech. Bobule ranějších odrůd budou v následujícím období získávat ontogenetickou rezistenci a choroba by se tak u nich už neměla projevovat progresivně. Středně rané a pozdní odrůdy je však nadále nutné ošetřovat účinnými prostředky proti padlí. Náchylné budou především odrůdy jako Frankovka, Chardonnay nebo Neuburské. Situace na vinicích se prakticky nemění, v současné době na všech lokalitách stále panuje obecně střední až vysoký infekční tlak padlí révového. V následujícím období by měla být situace podobná nebo se předpokládají mírně horší podmínky pro další rozvoj infekce. Na místech se silným napadením keřů doporučujeme aplikovat Karathane New.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

V minulém období se srážky objevily spíše sporadicky, bylo převážně slunečno. Následující období bude charakteristické teplotami okolo 28 °C, častými srážkami a vyšší vlhkostí vzduchu. Takové podmínky budou pro plísně vhodné, protože by mohla listová plocha zůstávat déle ovlhčená. Na vinicích, kde byla zavčasu podchycena preventivní ochrana keřů, se doposud nemusely objevit žádné specifické příznaky choroby. Nadále však panují velmi příznivé podmínky pro patogen a síla infekčního tlaku je hodnocena obecně jako střední. Vzhledem k aktuální situaci a na základě vyhlídky do dalšího období doporučujeme nadále využívat nejlépe systémově působící fungicidy, které zajišťují velmi účinnou ochranu s dlouhou reziduální účinností.

Riziko rozvoje: slabé střední silné

Výhled počasí



VINAŘSKÉ POTŘEBY

Další důležité informace:

Na vinicích by již v tuto chvíli mělo probíhat 2.-3. komplexní ošetření keřů po kvetení. Nacházíme se rovněž v období vhodném pro osečkování letorostů s cílem minimalizovat příznivé podmínky pro další rozvoj houbových chorob. V případě, že se na vinici vyskytly příznaky silného napadení keřů, je na místě sáhnout po osvědčených „zhášečích“. Proti plísni révové doporučujeme **CYMBAL**, padlí dokáže efektivně zastavit přípravek **KARATHANE NEW.**

Nadále doporučujeme do každého tankmixu k vybraným systémově nebo kombinovaně působícím přípravkům přidávat také síru. Tu nabízíme buď ve formě práškové (KUMULUS) nebo suspenzní (SULFOMAX) – v obou případech je obsah síry 80 %. Síra rostliny nejen chrání před padlím, ale působí na ně i z hlediska jejich výživy. Pro představu, keře révy vinné si pro své vyvážené fungování nárokují síru jakožto sekundární živinu na hektar obdobně jako fosfor.

INTENZITA INFEKČNÍHO TLAKU DLE VYBRANÝCH LOKALIT



DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové		plíseň révová	
PROFI	HOBBY	PROFI	HOBBY
LUNA EXPERIENCE	**DYNALI**	**RIDOMIL**	**MILDICUT**
VIVANDO	**MAGNICUR CORE**	**MILDICUT**	**CABRIO TOP**
KUMULUS	**KUMULUS**	**FLOWBRIX**	**CHAMPION**

silný	střední	slabý