

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 13

Týden: 31

Období: 3. 8. - 9. 8. 2021



PADLÍ RÉVOVÉ ●●

Především bobule raných odrůd jsou nyní lépe odolné vůči napadení. Na některých lokalitách však lze pozorovat výraznější napadení padlím, především na hroznech a zálistcích může být nyní postup infekce evidentní. Při výrazném intenzivním slunečném počasí mohou takové projevy pokračovat. Nicméně, **v následujícím období očekáváme spíše bouřkový a srážkově bohatý charakter počasí, který by neměl chorobě vytvářet příznivé podmínky.** Na místech, kde bylo zjištěno velmi silné napadení (nejčastěji s jasně viditelným šedým povlakem na hroznech, příp. až výhřez bobulí) jednoznačně doporučujeme aplikaci přípravku KARATHANE NEW. Tento fungicid velmi rychle zastavuje další postup infekce na rostlinách a navíc omezuje výskyt svilušek. Aplikaci postřiku soustřeďte především do oblasti zóny hroznů. Tlak padlí révového je nyní obecně na vysoké až střední úrovni a měl by spíše slábnout.


PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●● / PLÍSEŇ ŠEDÁ ●●

V posledním období došlo na mnoha místech k výraznějším dešťovým srážkám a delšímu ovlhčení listové plochy. Nadále jsou tak vytvářeny podmínky pro existenci infekčního tlaku peronospory. Na vinicích již viditelně postižených plísní lze předpokládat další rychlé šíření choroby. Právě na silně napadených místech bude nutné v krajně nutných případech použít zhášec CYMBAL. Obecně se potýkáme se středním až vysokým infekčním tlakem plísně révové. **Vzhledem k aktuálnímu počasí (předpoklad dešťových přeháněk a ochlazení) je nyní potřebné věnovat zvýšenou pozornost ošetření proti botrytidě. Postupně s narůstající koncentrací cukrů v bobulích přijde následně i období zvýšené vnímavosti hroznů k infekci.** Ideálně doporučujeme aplikaci kombinovaného prostředku proti plísni šedé s kontaktním i systémovým účinkem **SWITCH**. Tlak plísně šedé je na střední úrovni.



Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné

Výhled počasí



Další důležité informace:

Přelom července a srpna naznačí, jak dobře byla na vinicích provedena základní preventivní ochrana keřů a načasování zelených prací. Každoročně se v tomto období ukazuje, jak důležité je začít s postřiky alespoň 2-3 týdny před kvetením. V tuto chvíli budou v ohrožení plísněmi zejména taková místa, kde se „šlo do postřiků“ až po odkvětu révy. Nyní je tedy nutné na obecně slaběji ošetřených místech nadále volit takové přípravky, které vykazují silný eradikativní účinek na rostliny. Ohrožená jsou především místa s výrazným množstvím aktuálně spadlých srážek nebo tam, kde je čerstvě provedené osečkování. Čerstvé rány na keřích totiž mohou snadno vytvořit velmi vhodné podmínky pro patogen. Klíčovým faktorem bude také vhodně načasované osečkování. Neosečkování keře totiž podstatně zhoršují mikroklima v listové stěně. Míru poškození plísní lze nyní na vinicích nejlépe detekovat na zálistcích. Především tam a také na zónu hroznů doporučujeme pokud možno aplikovat postřiky přednostně.

Pozornost se v tuto chvíli upírá především k preventivní ochraně před plísní šedou. Zde doporučujeme v závislosti na míře rizika rozvoje botrytidy zvolit vhodný fungicid. Je potřeba přihlídnout k více faktorům (rizikovost lokality, míra dosavadních srážek, půdní nasycenost a náchylnost odrůdy k chorobě) vybrat přípravek, např. TELDOR, SWITCH, SCALA.





obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice		
Bořetice		
Bzenec		
Čejkovice		
Kobylí		
Lednice		
Mikulčice		
Mikulov		
Nosislav		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Sedlec		
Strážnice		
Svatobořice		
Valtice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Svatý Jur (SK)		
Šenkvice (SK)		
Nitra (SK)		
silný	střední	slabý

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

LUNA EXPERIENCE

KARATHANE NEW

PEGASO F

MILDICUT

VIVANDO

SERCADIS

ORVEGO

FOLPAN

DOMARK

TOPAS

FOLPAN GOLD

CHAMPION

silný

střední

slabý