

BS SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 13

Týden: 31

Období: 3. 8. – 9. 8. 2022

PADLÍ RÉVOVÉ

Na rizikových místech a tam, kde jsou evidentní jasné příznaky padlí, je nutné provést ještě alespoň jedno ošetření systémovým fungicidem. Velmi dobrým přípravkem s léčivým účinkem proti aktuálně probíhající chorobě na keři je KARATHANE NEW (*meptyldinokap*), ten lze použít až 4x během vegetace a nejpozději 21 dní před odhadovanou sklizní. Na meteorologických stanicích byl během minulého období zaznamenán nepatrný růst podmínek vhodných k šíření padlí. Například v Popicích nebo v Pavlově tak došlo v průběhu posledních dnů ke změně ze slabého infekčního tlaku na středně rizikový, na těchto místech to platí pro padlí i plíseň révy. Podmínky k šíření houbových chorob jsou jinak aktuálně nejvíce příznivé na Bzenecku či Strážnicku, naopak na jižní Moravě hodnotíme situaci příznivěji.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

V případě silného infekčního tlaku a na místech s viditelnými příznaky plísně révy doporučujeme nadále aplikovat kombinovaně působící fungicidy za současného respektování doby kurativního působení. Vhodnými přípravky jsou například Forum Star nebo Melody Combi, tyto při doporučené dávce zajistí dlouhou účinnost a poctivou ochranu (uvedené přípravky působí systémově, hloubkově). Na vinicích, které dospěly do fáze počátku zrání již bude končit vnímavost hroznů k napadení. Nadále však může docházet k infekcím listů, zejména nově narostlých zálistcích. K významným primárním infekcím hroznů však již nemůže dojít. Nadále je třeba ošetřovat zejména porosty s výskytem choroby a upřednostnit v tomto období kontaktně i systémově působící fungicidy. Pro poslední ošetření proti plísni révy jsou z často používaných měďnatých přípravků vhodné především fungicidy Cuproxat, Flowbrix nebo Champion. V tomto kontextu je důležité pohlídat si hektarové dávky mědi a nepřekročit stanovený limit!



Infekční tlak:

silný
střední
slabý

Další důležité informace:

Ještě před uzavřením bobulí je třeba provést postřik proti plísni šedé. Další dny v tomto směru doporučujeme pokračovat, a to zejména na rizikových místech. Jakmile se hrozen kompletně uzavře, aplikovaný postřik se už dovnitř hroznu nedostane. Narůstající obsah cukrů v bobulích, deštivo, to vše v kombinaci s déletrvajícím vlhkem pak může umocnit masivní rozšíření této houbové choroby uvnitř neošetřeného hroznu. Jako prevence je také vhodné na rizikových lokalitách omezit hnojení keřů dusíkatými hnojivy. **Doporučujeme v závislosti na míře rizika rozvoje botrytidy a s ohledem na termín sklizně volit vhodné fungicidy jako TELDOR, SWITCH, SCALA, příp. novinku SERIFEL.**



Jakmile se půlí červenec a srpen, zpravidla se vinařům ukazuje, jak dobře se dosud o vinice postarali. Důležitá v tomto směru je především preventivní ochrana pomocí chemických či ekologických přípravků. Velmi důležitou roli v aktuální podobě vinic jistě sehrálo i vhodné načasování a provedení zelených prací. Keře, na které dopadly první spolehlivé postřiky již před kvetením, bývají pravidelně zdravé. Míru aktuálního poškození keřů plísněmi lze nyní na vinicích nejlépe detekovat na zálistcích. Především tam a také na zónu hroznů tak doporučujeme pokud možno aplikovat postřiky přednostně. Nezřídka si lze letos dále všimnout, že se nedostatek srážek v průběhu července na některých místech postaral o menší velikost bobulí a očekávat lze i předčasný opad listů, srovnáme-li toto s obdobím minulého ročníku. Doufejme, že v srpnu ještě průběžně zaprší.

Na ohrožených porostech (především nové výsadby, mladé porosty) je potřeba sledovat poškození porostů hálčivcem či vlnovníkem. Druhá dekáda srpna nabízí vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem samiček do zimních úkrytů. K ošetření lze použít sirnaté přípravky Kumulus nebo Sulfomax, příp. Ortus (kontaktní insekticidní přípravek určený k ochraně proti svilušce ovocné, chmelové a révy vinné proti hálčivcům a vlnovníkům).



Doporučené přípravky dle intenzity infekčního tlaku pro profi/hobby uživatele

PADLÍ RÉVOVÉ

PROFI

HOBBY

LUNA MAX+KUMULUS

TOPAS+KUMULUS

DOMARK

MAGNICURE CORE

DRAFOS

DRAFOS

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

PROFI

HOBBY

MELODY COMBI+CHAMPION

FOLPAN+CHAMPION

PEGASO F

FOLPAN

DRAFOS

DRAFOS


Infekční tlak:

silný

střední

slabý

Intenzita infekčního tlaku dle jednotlivých lokalit:



Výhled počasí

Do pátku lze na řadě míst opět výhledově očekávat tropické teploty. Pokud je to možné, doporučujeme posunout aplikaci plánovaných postřiků na dny, kdy se opět „ochladí“ pod 30 °C. Pravděpodobné nulové srážky a sympatické letní teploty pak od víkendu vytvoří podmínky vhodné k dozrávání velmi raných odrůd.

