

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 14

Týden: 32

Období: 10. 8. - 17. 8. 2021



PADLÍ RÉVOVÉ ●

Na základě vývoje předešlých dnů došlo k zesílení podmínek vhodných pro šíření padlí. Keře by ale v tuto chvíli již měli být k chorobě odolnější. Odolnost bobulí k nové infekci se zvyšuje zejména po zaměkání. Pokud se infekce na bobulích objeví už před zaměkáním bobulí a účinná ochrana nebyla dostatečná, může docházet k napadení i po zaměkání. Doporučujeme na místech silněji postižených padlím volit takové přípravky, které vykazují silný eradikativní účinek. U raných a velmi raných odrůd už je vhodné omezit sirnaté přípravky. U ostatních odrůd je stále možné fungicidní a baktericidní účinky síry využívat. Přípravky KUMULUS nebo SULFOMAX s vysokým podílem účinné látky (80 % S) lze aplikovat až do období začátku zrání, blednutí bobulí, příp. do začátku vybarvování (BBCH 81).


PLÍSEŇ RÉVOVÁ ● / PLÍSEŇ ŠEDÁ ●●

V uplynulém týdnu přes nás přecházelo několik frontálních systémů. Srážky se objevovaly prakticky každý den, většinou byly lokální a intenzivní. V posledním období spadlo na hodnocených lokalitách od 40 do 70 mm a také díky tomu se vytvořily velmi dobré podmínky pro zesílení tlaku plísně. Například v Popicích spadlo jen během čtvrtka až 66 mm. Naopak Přítluky nebo Valtice hlásí v porovnání s ostatními lokalitami srážky podstatně nižší. Na vinicích jsou nyní vytvářeny podmínky především pro existenci infekčního tlaku plísně šedé. Právě této chorobě je potřebné věnovat velkou pozornost a zacílit na ni s vhodnou fungicidní ochranou. Ohroženy jsou nyní především velmi rané a rané odrůdy. Pro pozdní odrůdy nepředstavuje srážkový průběh poslední dekády významné riziko z pohledu botrytidy. Z fungicidů lze nyní využít i ty, které působí současně proti plísni révové a plísni šedé jako MELODY COMBI, PEGASO F, FOLPAN nebo FOLPAN GOLD.



Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ●● silné

Výhled počasí



Další důležité informace:



Při aplikaci postřiků doporučujeme v následujícím období cílit pokud možno především do zóny hroznů. **Primárně by se měla aplikační kapalina dostat na hrozny a nově přirůstající zálistky.** Při použití jakéhokoli přípravku k ochraně révy vinné je také třeba dodržet stanovenou ochrannou lhůtu (OL). **Fungicid již tedy volte s ohledem na ranost dané odrůdy.** Krátkou OL 14 dní mají přípravky TELDOR, MAGNICUR QUICK nebo PROLECTUS. Jako ekologickou variantu lze využít například BYLINKOVOU SMĚS NA PLÍSŇ.

Aktuálně lze před dozráváním posílit odolnost keřů vůči houbovým chorobám také pomocí vhodných listových hnojiv. Výhodou je, že rostliny ke zrání podpoříme dostatkem živin a že u hnojiv obecně není nutné řešit ochrannou lhůtu vůči keřům (i tak by ale měla být tato hnojiva aplikována maximálně týden před plánovanou sklizní). Vápník obsažený ve hnojivu WUXAL KALCIUM posiluje pevnost buněčných stěn a tedy i slupek bobulí. Dalším hnojivem s vysokou přidanou hodnotou ve formě zásaditého pH 10 je DRAFOS. Vysoké pH spolehlivě vytvoří nevhodné podmínky všem kyselomilným houbovým patogenům.





obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice		
Bzenec		
Čejkovice		
Kobylí		
Lednice		
Mikulčice		
Mikulov		
Nosislav		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Sedlec		
Strážnice		
Svatobořice		
Valtice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Svatý Jur (SK)		
Šenkvice (SK)		
Nitra (SK)		
silný	střední	slabý

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

VIVANDO

KARATHANE NEW

MELODY COMBI

MILDICUT

DOMARK

DYNALI

MILDICUT

FOLPAN

SULFOMAX

SULFOMAX

FOLPAN GOLD

CHAMPION

silný

střední

slabý