



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 7

Týden: 26

Období: 27. 6. - 3. 7. 2023

PADLÍ RÉVOVÉ ● ●

V aktuálním období po odkvětu až po velikost broku nastupuje fáze nejvyšší vnímavosti mladých hroznů k napadení. V následujících týdnech je i vzhledem ke vhodnosti podmínek doporučeno aplikovat systémové přípravky s výrazným účinkem proti patogenu. Obzvláště odrůdy bujnějšího růstu se silnějším zahuštěním keřů bude nutné důkladně „provětrat“, maximalizovat proudění vzduchu zejména v oblasti květenství i zintenzivnit obecně zelené práce. Musíme nyní předpokládat vhodné podmínky k šíření choroby, zejména na významně záhřevných místech. Především na takových místech je pak ideální účinná látka spiroxamin. Hlavní doporučené přípravky na následující období: KUMULUS, SULFOMAX, PRONTO, DYNALI, ALCEDO, DOMARK, VIVANDO, BELANTY, TOPAS, LUNA EXPERIENCE, SONATA.



PLÍSEŇ RÉVOVÁ ● ●










Na mnoha místech je možné aktuálně spatřit olejové skvrny na listech jakožto jeden z hlavních ukazatelů napadení keřů peronosporou. Dále se bohužel čteně objevují i nekvalitně odkvetlé okvětní lístky, pod kterými se mohou objevit počínající zárodky plísně šedé. Vinu na tom nesou především déletrvající srážky v době kvetení révy vinné. V tuto chvíli je na takových místech nezbytně nutné aplikovat systémově působící přípravky proti plísni šedé jako SWITCH nebo využít takových fungicidů, které svým vedlejším efektem spolehlivě účinkují i proti této chorobě. Na některých místech byly splněny primární infekce i třikrát, typické příznaky se objevují na mnoha místech – tyto ukazatele jsou jasným signálem, že je nutné zesílit ochranu proti plísni révové. Hlavní doporučené přípravky na následující období: MILDICUT, PROFILER, MELODY COMBI, CASSIOPEE, DEFENDER DRY, ALTELA, FLOWBRIX.



Další důležité informace:

KŘÍSEK RÉVOVÝ je nejvýznamnějším přenašečem choroby révy vinné – zlatého žloutnutí (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma* – GFDP). Jeho první výskyt byl potvrzen na Moravě v roce 2021. Od té doby je tento přenašeč v hledáčku!


Rozlišení jednotlivých vývojových stupňů nymf kříška révového

bělavé zbarvení těla (N1 + N2)	žlutavé zbarvení těla (N3 + N4)	výrazná hnědá kresba i na hrudních člancích (N5)	
<p>N1 – pouze 4 sety na konci posledního zadečkového článku (velikost cca 1,8 mm)</p>  	<p>N2 – poslední zadečkový článek celý obrvený (velikost cca 2,4 mm)</p>  	<p>N3 – poměr boční části středohruďi a zadohruďi je cca 1:1 (velikost cca 3,3 mm)</p>  	<p>N4 – poměr boční části středohruďi a zadohruďi je cca 2:1 (velikost cca 4,3 mm)</p>  
		<p>N5 – boční část středohruďi překrývá celou zadohruď (velikost cca 5,5 mm)</p>  <p>Další znaky N5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „W“ na středohruďi • 2 světlé, +/- kruhové skvrny na zadohruďi 	



UKZÚZ informuje, že aktuálně není potřeba révu ošetřovat proti tomuto přenašeči. Ve vinohradech se vyskytují křísci převážně ve stadiu nymf 1. a 2. stupně, které ještě nemohou GFDP přenášet. To však neplatí pro nymfy kříška od 4. vývojového stupně. Proto doporučujeme pravidelně sledovat nejen své vinice a ÚŘEDNÍ DESKU ÚKZÚZ. Nabízíme přípravek proti kříšům **SIVANTO PRIME (0,5 l/ha)**

Výhled počasí



Příliš silné srážky však mohou ohrozit také správný průběh kvetení. Zejména **u citlivých odrůd ke sprchávání může být negativně ovlivněno opylení a následné nasazování bobulí.** Toto lze do jisté míry ovlivnit listovou výživou s obsahem zinku). **INFOSFOR (k objednání), WUXAL SUPER, VÍNOFIT.**

INTENZITA
INFEKČNÍHO
TLAKU DLE
VYBRANÝCH
LOKALIT

obec	INFEKČNÍ TLAK	
	PADLÍ RÉVOVÉ	PLÍSEŇ RÉVOVÁ
BLATNICE	Yellow	Yellow
BZENEC	Yellow	Yellow
DUBŇANY	Yellow	Yellow
KOBYLÍ	Green	Yellow
LEDNICE	Yellow	Yellow
MIKULČICE	Yellow	Yellow
MIKULOV	Yellow	Green
NOSISLAV	Yellow	Green
PAVLOV	Yellow	Green
POPICE	Yellow	Green
SEDLEC	Yellow	Green
STRÁŽNICE	Yellow	Yellow
SVATOBŔŘICE	Yellow	Yellow
VALTICE	Yellow	Green
VELKÉ BÍLOVICE	Red	Green
VELKÉ PAVLOVICE	Yellow	Green
ZNOJMO	Green	Yellow
MODRA (SK)	Yellow	Yellow
ŠENKVICE (SK)	Green	Green
NITRA (SK)	Yellow	Yellow

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

PRONTO

BELANTY

LUNA EXPERIENCE

TOPAS

CASSIOPEE

FOLPAN

KUMULUS

KUMULUS

FLOWBRIX

CHAMPION

Infekční tlak

slabý

střední

silný