

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 8

Týden: 26

Období: 29. 6. - 5. 7. 2021



PADLÍ RÉVOVÉ



Na více místech došlo během posledního období k vzestupu rizika šíření padlí na vysoký stupeň. V nejvyšším stupni ohrožení se nyní nacházejí například Velké Pavlovice nebo Strážnice, tam jsou podmínky pro šíření infekce velmi příhodné. Obecně tlak padlí na vinicích během posledního období citelně vzrostl a i nadále jsou predikovány vhodné podmínky pro šíření, Zejména na významně záhřevných místech. V následujícím období bude o všem rozhodovat kvalitní fungicidní ochrana s přípravky na bázi systémových účinků. V těchto chvílích je réva k napadení padlím stále vysoce citlivá. Šíření infekce by mohl omezit častější výskyt přeháněk. Mohlo by tak dojít k částečnému smytí spor hub z rostlin, čímž by se míra napadení omezila.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ



V posledním období místy spadlo větší množství srážek. Například ve Svatobořicích napadlo ze čtvrtka na pátek téměř 50 mm. Relativně dobře zapršelo i na místech, kterým se doposud srážky spíše vyhýbaly, příkladem je oblast Kobylí. Nyní, v době kvetení a krátce po odkvětu, je aktuální vysoká vnímavost květenství k napadení plísní. Primární infekce lze nejlépe podchytit sledováním keřů v níže položených částech vinic, vinic v blízkosti lesních porostů nebo vodních ploch či v uzavřených a hůře „větraných“ polohách. Dle zjevných příznaků je pak nutné zintenzivnit ochranu. Ohroženy jsou nadále nejvíce náchylné odrůdy nebo ty s hustějším květenstvím (např. Müller Thurgau, Lena, Johanitter).


Riziko rozvoje:  slabé

 střední

 silné



Výhled počasí



Další důležité informace:



Mnoho vinic se během pár minut ocitlo v doslova katastrofální situaci. Na mnoha lokalitách došlo k velmi silnému krupobití, kdy kroupy dosahovaly velikosti tenisových míčků a podstatně narušily a poničily stovky hektarů (drátěnky, vedení i keře). V tom nejhorším případě byly vinice úplně zdevastovány velmi silným tornádem. Jedná se o extrémně nešťastnou událost a všem zasaženým vinařům přejeme hodně sil a víry v lepší zítřky.

Vinice, které jsou zasaženy „pouze“ krupobitím, bude nutné co nejrychleji regenerovat. Narušená listová plocha, polámané letorosty a květenství nyní vytváří nežádanou vstupní bránu pro různé patogeny. Proto **bude nutné posílit fungicidní ochranu a zaměřit se i na ošetření, které podpoří celkový růst keřů.** Vhodná je nyní aplikace přípravků na bázi stimulace růstu (huminové látky, extrakty z mořských řas, přípravky na bázi prospěšných mikroorganismů, listová hnojiva s vyšším obsahem dusíku a draslíku). Doporučujeme například **ALGAHUMIN, AMALGEROL, WUXAL KOMBI, VÍNOFIT.** U silně zasažených vinic bude v krajních případech bohužel nutné přistoupit k řezu dle aktuální situace a k následnému ošetření řezných ran.





obec	Infekční tlak	
	padlí révové	plíseň révová
Blatnice		
Bzenec		
Čejkovice		
Kobylí		
Lednice		
Mikulčice		
Mikulov		
Nosislav		
Pavlov		
Popice		
Přítluky		
Sedlec		
Strážnice		
Svatobořice		
Valtice		
Velké Bílovice		
Velké Pavlovice		
Znojmo		
Modra (SK)		
Šenkvice (SK)		
Nové Zámky (SK)		
Golianovo - Darmoty (SK)		
Legenda	slabý	střední

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové

plíseň révová

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

VIVANDO

DYNALI

MELODY COMBI

RIDOMIL

PROSPER

CABRIO TOP

MILDICUT

MILDICUT

KUMULUS

KUMULUS

CUPROXAT

FOLPAN

Legenda

slabý

střední

silný