



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

AKTUÁLNĚ

Č.4

TÝDEN: 21.

OBDOBÍ: 19.5.2025-25.5.2025

„V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.“

Na některých stanovištích sledujeme následky pozdních jarních mrazíků. Rekonvalescence postižených porostů může být příznivější díky vyšším denním teplotám. Nemanipulujte s poškozenými letorosty a už vůbec je neodstraňujte. Pokud jsou v pořádku, do 14 dnů se letorosty vrátí do procesu vegetace. Doporučujeme zapojit listovou výživou (více na str. 2). Očekáváme mírné oteplení propojené se srážkovou činností – nevylučují se přeháňky a koncem týdne bouřky, případně výraznější úhrn srážek. Toto počasí by mohlo způsobit vyšší riziko infekčního tlaku chorob.

Réva se nachází ve fenofázi vývoje listů, **BBCH 15-18** – pozorujeme vzrostlé letorosty i přítomnou násadu. Dle odrůd a stanovišť se můžeme pomalu připravovat na ošetření před květem.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Ohrožení mladých listů peronosporou momentálně na sledovaných stanovištích nesledujeme – nebyli naplněny podmínky šíření infekce. Koncem týdne se ale mohou podmínky zhoršit.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **FOLPAN, CHAMPION, PEGASO, MELODY COMBI**

PADLÍ RÉVOVÉ ●●

Chladnější rána a teplé dny ve spojení s vyšší vzdušnou vlhkostí jsou ideálními podmínkami pro šíření padlí.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: **TOPAS, DYNALI, LUNA EXP, BELANTY**

Semafor rizika rozvoje patogenu:



mírné



střední



vysoké



[Obr. 1] Fáze sedmého až osmého listu



[Obr. 2] Aktuální stav květenství

bs DOPORUČUJE


VÝŽIVA A OCHRANA

ŽRAVÍ ŠKŮDCI – osenice a různorožci jsou vskutku nepříjemnou komplikací – jejich činností vznikají nemalé škody na vykousaných očkách, kterým ničí přímou růstovou osu, případně květenství nebo přenos houbových chorob. Krom manuální likvidace doporučujeme následující přípravky:

Přípravky – **Lepinox Plus** (1 kg/ha) + **Spintor** (0,6 l/ha)

ROZTOČI – jejich činnost, zejména hálčivce a vlnovníka, je v nástupu jara často nepříjemnou komplikací pro efektivní rašení a růst letorostů. Pro tyto účely je vhodné použít silnou dávku doporučených přípravků před vyrašením nalitých očk. Aplikace by měla zohledňovat dávku (3-násobek běžné), dále teploty (ideálem je kolem 15 °C) a období (před vyrašením). Pozornost si již v této době zaslouží také ochrana proti sviluškám.

Přípravky – **Kumulus** (9-12 kg/ha), **Typhlodromus pyri**, **Nissorun** (0,8 kg/ha), **Bylinková směs na svilušky** (20g /l)



OBALEČI - na vinicích s pravidelným výskytem obalečů doporučujeme aktuální preventivní ochranu s přípravkem **Spintor**.

VÝŽIVA – vhodné je také zapojení listových hnojiv na bázi dusíku, ideálně v kombinaci se sírou. V případě síry je ale nutné počítat se solidním účinkem pouze v případě aplikace během teploty vyšší než 16(17)°C, optimální účinnost postřiku je pak do 25°C.

Přípravky – **Vegaflor, NPK**

JARNÍ MRAZY – v důsledku poškození vegetace jarními mrazy je vhodné podpořit regeneraci a nově rašící očka vhodnou výživou, zejména dusíkem a aminokyselinami. Doporučujeme proto **HYCOL-E víno**.

Před kvetením doporučujeme podpořit rostliny **MICROSTIM RÉVA I** (s formulací živin před květem) a **MICROSTIM RÉVA II** (s formulací mikroživin po odkvětu).

Pokud jsou na keřích pozorovány chlorózy, doporučujeme hnojivo s chelátově vázaným železem **MICROSTIM Fe**. To může pomoci s odstraněním latentního i zjevného deficitu železa.



HODNOCENÍ :

INTENZITA
VÝSKYTU
INFEKČNÍHO
TLAKU VE
VYBRANÝCH
LOKALITÁCH



SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň révová

padlí révové

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY



PEGASO

FOLPAN

VIVANDO

KARATHANE NEW

MILDICUT

CHAMPION

ALCEDO

KUMULUS



riziko napadení

silné

střední

slabé

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ

KOMENTÁŘ **bs:** Dle NOAA a ČHMÚ nás čeká proměnlivé počasí. Očekáváme oteplení propojené se srážkovou činností – nevylučují se přeháňky a koncem týdne dokonce bouřky, případně výraznějším úhrnem srážek. Toto počasí by mohlo způsobit vyšší infekční tlaky chorob.

