



SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

AKTUÁLNĚ

Č.12

TÝDEN: 29.

OBDOBÍ: 14.7.2025-20.7.2025

„Je-li na svatého Vincence slunečno, bude letos hodně vína“.

Na většině zkoumaných stanovištích pozorujeme fenofázi uzavírání hroznů, ať už v počáteční, nebo pokročilé fázi (**BBCH 73-75**). Vzhledem k dostatku srážek v uplynulém týdnu je určitě potřeba kontrolovat porosty a sledovat vývoj počasí, protože rozvoj infekce padlí by mohl ve fázi uzavírání hroznů znamenat fatální následky pro sklizeň. Nástup nového týdne bude sice slunečný a teplý, ale ve středu by se mělo počasí pokazit, dojde k ochlazení za doprovodu deštivého a vlhkého počasí. Tyto podmínky mohou zamíchat i rozvojem tlaku patogenů.

Porosty je nyní potřeba vytrvale zastrkovat do drátěnky, zejména kvůli rizikům způsobeným přehuštěnou a nekontrolovatelně rostoucí listovou stěnou a vysokou vzdušnou vlhkostí. Rozhodně to pomůže i zlepšení aplikace postřiků a exponu bobulí ke sluníčku. Osečkování zastrčených porostů je nyní velmi vhodné – tímto akcelerujeme efektivnější zásobení bobulí a zrání hroznů.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Nyní monitorujeme klesající tendenci tlaku peronospóry. Pokud by snad mohlo dojít k problémům, bude to až ke konci týdne, ale tento průběh je zatím jenom prediktivní a spíše nabádá ke zvýšené opatrnosti. Napadení mladých listů by mohlo zkomplikovat závěr vegetace a vyzrávání hroznů.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: CYMBAL, FLOWBRIX, FOLPAN, DEFENDER DRY

PADLÍ RÉVOVÉ

V tomto období – uzavírání hroznů – je potřeba vytrvale hlídat jakékoliv náznaky infekce a udržovat porosty vzdušné k minimalizaci infekčních tlaků. Není radno podceňovat průběh tohoto týdne.

Z PŘÍPRAVKŮ DÁLE DOPORUČUJEME: COLLIS, SPIROX, DYNALI, SERCADIS, LUNA EXP

Semafor rizika rozvoje patogenu:  mírné  střední  vysoké



bs DOPORUČUJE

VÝŽIVA A OCHRANA

V následujícím období je klíčové držet pod kontrolou porost rozvíjející se hrozny. Pokud se rozhodnete sáhnout po herbicidu, doporučujeme přípravek **BELOUKHA**, který působí kontaktně, obsahuje kyselinu pelargonovou, účinnou látku přírodního původu. Doporučené aplikace na mladé, rostoucí plevle do výšky max. 10-12 cm. V půdě se rozkládá do 5 dnů. Za slunečního počasí působí velmi rychle – první příznaky jsou viditelné do 3 hodin po aplikaci. K úplnému zaschnutí dochází během 1-2 dnů. Přípravek musí být aplikován na suché listy, optimálně ráno, při minimální teplotě 15°C. **Kromě výmladků nesmí zasáhnout jiné zelené části ošetřované révy.** Déšť 2 hodiny po aplikaci snižuje účinek.

V tomto počasí je ochranný postřik více než vhodný a proto je příhodné mít k dispozici podpůrné smáčedlo, zlepšující aplikaci a vytrvalost ochranných látek → → → →



Silwet Star má unikátní organosilikátové složení a snižuje povrchové napětí postřiků, čím mnohem účinněji zlepšuje ulpívání na povrchu rostlin.

Wetcit zlepšuje přilnavost a omezuje úlet postřiků, zamezuje smývání postřiků deštěm a potenciálně snižuje potřebu aplikační dávky ochranného prostředku.

AgroVital je multifunkční pomocná látka, která prodlužuje ochrannou lhůtu postřiků a umožňuje lepší vstřebávání účinné látky. Dalším benefitem je účinek smáčedla vůči rozvoji patogenů.

Ekol působí dotykově, ulpívá na povrchu rostlin a vytváří olejový film, zabraňuje dýchání škůdců, a tím přispívá k jejich usmrcení. Toto smáčedlo zvyšuje účinnost pesticidů a je vhodné do ekologického zemědělství.

Dále můžeme doporučit **HYCOL-E víno**, který funguje jako přírodní smáčedlo a zároveň obsahuje vhodnou kombinaci živin pro prevenci vůči sprchávání a tvorbu bobulí (Dusík, Draslík, Bór, Zinek i Molybden). Regeneraci letorostů poškozených jarními mrazy a obsahující opožděná květenství můžete podpořit také přípravky typu **NPK, Vegaflor, Vínofit** nebo **Wuxal Super**.

HODNOCENÍ **bs:**

INTENZITA
VÝSKYTU
INFEKČNÍHO
TLAKU VE
VYBRANÝCH
LOKALITÁCH

stanice	plíseň réвовá	padlí réвовé
BLATNICE	slabý	střední
BZENEC	slabý	střední
HOSTĚRADICE	slabý	střední
HNANICE	střední	střední
HUSTOPEČE	střední	střední
KOBYLÍ	slabý	střední
MIKULČICE	slabý	střední
MIKULOV	slabý	střední
NOSISLAV	střední	střední
PAVLOV	slabý	střední
POPICE	slabý	střední
SEDLÉČ	slabý	střední
STRÁŽNICE	střední	střední
SVATOBOŘICE	střední	střední
VALTICE	slabý	střední
VELKÉ BÍLOVICE	slabý	střední
VELKÉ PAVLOVICE	slabý	střední
VRBOVEC	střední	střední
ZNOJMO	slabý	střední
KADAŇ	slabý	střední
SLANÝ	slabý	střední
VLKOV	slabý	střední
MODRA (SK)	střední	slabý
SUCHÁ N.P. (SK)	slabý	střední



Hodnocení probíhá dle aktivních dostupných meteostanic:

plíseň: Model hodnocení podle Šteberly padlí: Model signalizace podle Kasta

infekční tlak slabý střední silný

SEMAFOR POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ

plíseň réвовá

padlí réвовé

PROFI

HOBBY

PROFI

HOBBY

MELODY COMBI

ZORVEC VINABEL

BELANTY

FOLPAN

MOMENTUM

CHAMPION

DYNALI

ALBIT

AIRONE

FLOWBRIX

KUMULUS

VITISAN



riziko napadení


silné

střední

slabé

SITUAČNÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU PATOGENŮ RÉVY VINNÉ

TÝDENNÍ VÝHLED POČASÍ



KOMENTÁŘ **bs:** V následujícím týdnu čekáme proměnlivé počasí. Oteplení z konce minulého týdne bude opět záležitostí několika dnů, než se ochladí vlivem deštivého počasí na 20 °C. Právě toto počasí by mohlo koncem týdne zvednout tendence tlaku chorob.