

CuproTonic

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: E.2.4.1 Kapalná směs stopových živin

Deklarovaný obsah:

Vlastnost	Hodnota
Vodorozpustná měď jako Cu v komplexu s HGA v %	5,3
Vodorozpustný zinek jako Zn v komplexu s HGA v %	1,0
pH	2,5 -4,0

Čistá hmotnost: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 l HDPE lahev; 5, 10 a 20 l HDPE kanystr a 1000 l IBC kontejner.

Evidenční číslo: E461

Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): **BioTomal s.r.o., Růbaň 176, 941 36 Růbaň**

ÚČINNOST HNOJIVA: CuproTonic je roztok hnojiva na bázi mědi, který optimalizuje výživu rostlin mědí a zinkem. Hnojivo zvyšuje odolnost rostlin. CuproTonic zvyšuje účinek fungicidů a tím snižuje jejich dávkování a je velmi účinný při preventivním boji. Vodorozpustná měď a zinek jsou ve formě glukonátů, které jsou velmi rychle absorbovány a asimilovány kořeny a pletivy rostlin, což vede k silnějším a zdravějším rostlinám.

NÁVOD NA POUŽITÍ HNOJIVA:

Plodina	Aplikace		Intervaly a doporučení
	postřik	zálivka	
Vinná réva	2-4 l/ha 400-1000 l vody/ha	3-5 l/ha 400-1000 l vody/ha	V případě potřeby opakujte 2 až 4 krát během vegetačního nebo nutričního stresu.
Ovocné sady	2-4 l/ha 400-1000 l vody/ha	3-5 l/ha 400-1000 l vody/ha	V případě potřeby opakujte 2 až 4 krát během vegetačního nebo nutričního stresu.
Zahradnictví	2-4 l/ha 400-1000 l vody/ha	3-5 l/ha 400-1000 l vody/ha	V případě potřeby opakujte 2 až 4 krát během vegetačního nebo nutričního stresu.
Obiloviny	2-4 l/ha 400-1000 l vody/ha	3-5 l/ha 400-1000 l vody/ha	V případě potřeby opakujte 2 až 4 krát během vegetačního nebo nutričního stresu.

Příprava postřikové kapaliny: Před použitím hnojivo vždy protřepejte. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se zachová doporučená dávka a aplikace se provádí na obou stranách listu. Před aplikací ověřte reakci rostlin na malém vzorku. Aplikační dávku hnojiva rozředte v malém množství vody a nalijte do postřikovače naplněného na ½ objem vodou a následně po zamíchání doplňte vodu na požadovaný objem.

Kompatibilita: Nedoporučujeme mísit se silnými kyselinami a povrchově aktivními látkami. Předem ověřte kompatibilitu látek.

Ochranná doba: 0 dní

Skladování: 3 roky

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum expirace: uvedeno na obalu

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:



Pozor GHS07

H302 Škodlivý po požití

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Podráždění kůže.

PRVNÍ POMOC: P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. **Při požití:** Nevvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento štítek. V případě potřeby se poraďte s lékařem. Při práci s hnojivem používejte obličejový štít, PVC zástěru, klobouk, gumové rukavice a boty. Po dokončení aplikace důkladně omyjte pokožku mýdlem a teplou vodou. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

SKLADOVÁNÍ A ZNEŠKODNENÍ ZBYTKŮ: Uchovávejte v původních obalech v suchých a chladných místnostech. Doporučená teplota +10 až +30 ° C. Uchovávejte mimo potravin, nápojů a krmiv. Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby v původním nepoškozeném obalu. Zbytky postřikové jichy se zředí a vystříkají na ošetřovanou plodinu. Vypláchnuté obaly mohou být likvidovány jako běžný odpad. Použité obaly se dále nepoužívají.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Dodatkové informace společností Bioka, s.r.o. jako výrobce: Společnost nepřebírá odpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním ani nepředvídatelnými klimatickými nebo přírodními podmínkami, které nastanou v rozmezí aplikace.

Původ hnojiva: Bioka, s.r.o., Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovensko