


**PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICID.
PRO NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.**

Folicur[®] koncentrát

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspo-emulze (SE) určený k ochraně růží proti padlí, černé skvrnitosti a rzi, okrasných rostlin proti padlí a rzím a zimostrázu proti skvrnitosti listů a cylindrokládové skvrnitosti listů.

Účinná látka: tebukonazol (ISO) 25 g/l (2,5 %)



VAROVÁNÍ

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

*EUH208 Obsahuje směs isothiazolonů. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
Před použitím si přečtete přiložený návod k použití.*

Držitel rozhodnutí o povolení/výrobce: BAYER S.A.S, 16 rue Jean-Marie Leclair,
F-69009 Lyon, Francie

Právní zástupce v ČR/dodavatel: BAYER s.r.o., Šiemensova 2717/4,
155 00 Praha 5; tel. 266 101 111

[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

Evidenční číslo:	5337-0
Balení a obsah:	HDPE láhev s odměrkou 50-500 mL
Datum výroby:	uvedeno na obalu
Číslo šarže:	uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech (teplota skladování +5 až +35 °C) Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozboru přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku

Přípravek obsahuje systémově působící tebukonazol, který se vyznačuje preventivní a částečnou kurativní účinností a dlouhou dobou působení (až 14 dnů).

Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus	Dávkování	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	Poznámka 4) k dávkování 5) k umístění
růže	padlí růžové, černá skvrnitost růže, rez růžová	0,4-0,6 % * (4-6 ml/ l vody)	-	1) od BBCH 10 2) při prvním výskytu	4) do počátku skanutí
okrasné rostliny	padlí, rzi	0,4 % (4 ml/ l vody)	-	1) od BBCH 10 2) při prvním výskytu	4) do počátku skanutí
zimostráz	skvrnitosti listů, cylindrokládiová skvrnitost listů	0,4 % (4 ml/ l vody)	-	1) od BBCH 10 2) při prvním výskytu	4) do počátku skanutí

OL (ochranná lhůta)-je doba mezi poslední aplikací a použitím; (-)- ochrannou lhůtu není nutné stanovit

*** Odstupňování dávek přípravku u růží podle velikosti rostlin:**

výška rostlin 50 cm a méně: 6 ml/ l vody

vyšší rostliny: 4 ml/ l vody

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
růže, okrasné rostliny	postřik	4x	7-14 dnů
zimostráz	postřik	6x	7-14 dnů

Upřesnění podmínek aplikace

Přípravek se aplikuje postřikovačem. Ošetření se provádí preventivně nebo nejpozději při prvních příznacích choroby. Postřikujte důkladně listy a stonky do takové míry, aby nedocházelo ke stékání (do skanutí – na listech se tvoří kapky). Je třeba ošetřit celou rostlinu včetně spodní strany listů.

Ošetření neprovádějte za slunečního svitu a za sucha (kořeny rostlin jsou suché). Neošetřujte rostliny v době plného květu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Přípravek může zanechat skvrny. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Příprava aplikační kapaliny

Přípravek v obalu je třeba nejprve homogenizovat protřepáním. Potom se odměřené množství přípravku vlije do nádrže postřikovače naplněné polovičním množstvím potřebné vody a poté se doplní zbývajícím množstvím vody a následně důkladně promíchá. Aplikační kapalinu spotřebujte do jednoho dne od přípravy. Připravujte pouze nezbytné množství.

Čištění aplikačního zařízení

Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou a výplachovou kapalinu poté vystříkejte na naposledy ošetřovanou plochu.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí

SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II. st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Ostatní	Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Podmínky správného skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých a větratelných prostorech při teplotách +5-(+35)°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Způsob odstraňování obalů a neupotřebitelných zbytků

Prázdné obaly, případně zbytky přípravku, se odloží jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných k tomu určených kontejnerů.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci používejte gumové nebo plastové rukavice, ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistickou pláštěnku, k ochraně hlavy čepici se štítkem nebo klobouk (není-li již kapuce) při postřiku ve výšce hlavy nebo směrem vzhůru a pracovní nebo ochrannou obuv (např. gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zahrádkářském terénu.

Poškozené ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Postřik provádějte jen za bezvětří či mírného vánku, v tom případě vždy ve směru po větru a od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí, ideálně však až druhý den.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát.

První pomoc

<i>Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (alergická kožní reakce) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.</i>	
Při nadýchání:	Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
Při zasažení kůže:	Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
Při zasažení očí:	Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití:	Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: **Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**