

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 13

Týden: 31

Období: 31. 7. - 6. 8. 2018



PADLÍ RÉVOVÉ ● ●

Na vinicích nastávají fenofáze zaměkání bobulí až zrání. Podle předpovědi počasí bude přetrvávat spíše střední infekční tlak. Nebezpečí sekundárních infekcí budou snižovat velmi vysoké teploty. Při teplotě nad 33 °C se rozvoj infekce omezuje, teploty nad 35 °C způsobují eradikativní účinek, kdy je patogen zničen. Zároveň se mohou objevit lokální srážky ve formě bouřek, které patogen z porostu „umyjí“. V místech, kde jsou viditelné známky napadení porostů, doporučujeme pokračovat v ochraně. Zdravé vinice v dalším období nebude třeba ošetřovat.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ ● ●

Infekční tlak plísně révové znovu zůstává na nejnižším stupni nebezpečí. Místa, u kterých byla provedena včasná a důkladná preventivní ochrana, nyní nejsou infekci vystavena. Na místech s viditelnými příznaky choroby nebo s častým výskytem plísně šedé, je vhodné pokračovat v ochraně pomocí některých z kombinovaných přípravků s kratší ochranou lhůtou (**Ridomil MZ** -OL 14 dní nebo **Melody Combi**- 28 dní). Zdravé vinice již nebude potřeba nadále ošetřovat.

ŠEDÁ HNILOBA RÉVY ● ●

Průběh letošní vegetace je velmi rychlý a sklizně se tak předpokládají s přibližně třítydenním předstihem. V následujícím období se zrání mírně zbrzdí velmi vysokými teplotami, které omezují výkonnost fotosyntézy (optimum pro zrání 25-30 °C). U ranějších odrůd může být jediným řešením lokálně systémový přípravek **Teldor** (OL 14 dní). Pro vystupňování cukernatosti a lepší vyžrání jednoletého dřeva doporučujeme přípravek **Drafos**, který zároveň spolehlivě chrání před plísnovými chorobami, případně ekologický přípravek **Vitisan**.


Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné

DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky dle infekčního tlaku		
	padlí réвовé	plíseň réвовá	padlí réвовé	plíseň réвовá	plíseň šedá
Blatnice	slabý	střední	Karathane New+Kumulus	Melody Combi	Serenade ASO
Bořetice	slabý	střední	Drafos	Defender Dry	Drafos
Bzenec	slabý	střední	Vitisan	Flowbrix	Vitisan
Čejč	slabý	střední			
Lednice	silný	střední			
Lužice	slabý	střední			
Mikulov	slabý	střední			
Němčičky	slabý	střední			
Nosislav	silný	střední			
Pavlov	slabý	střední			
Popice	silný	střední			
Přítluky	silný	střední			
Ratíškovice	slabý	střední			
Stošíkovice	slabý	střední			
Strážnice	silný	střední			
Těšany	silný	střední			
Tvrdonice	slabý	střední			
Valtice	slabý	střední			
Velké Bílovice	silný	střední			
Velké Pavlovice	slabý	střední			
Vnorovy	silný	střední			
Znojmo	slabý	střední			
Modra (SK)	slabý	střední			
Šenkvice (SK)	slabý	střední			
Svatý Jur (SK)	slabý	střední			
Legenda	slabý	střední	silný	nehodnoceno	



Výhled počasí a další informace:



Ve vinicích byly zaznamenány **první výskyty octomilky *Drosophila suzukii***, která napadá zrající bobule a způsobuje octovou hnilobu. Vhodným řešením proti tomuto škůdci může být ekologický přípravek **SERENADE ASO**, který účinkuje i proti plísni šedé.



V tomto období budou panovat velmi vysoké teploty, čímž bude docházet ke značným stresovým podmínkám. Suchem mohou být ovlivněny zejména mladé výsadby. Doporučujeme aplikaci protistresových přípravků s převahou humínových látek, např. **Alga 95** či **Algahumin**.

